

Mijn teef is drachtig

Is uw teef onlangs loops geweest, heeft een reu haar gedekt en heeft u ze aan elkaar zien hangen? Dan is de kans erg groot dat uw teef nu drachtig is.

Met deze informatie hopen wij u een klein beetje te kunnen voorbereiden op hetgeen u kunt verwachten de komende tijd.

De dracht

De gemiddelde drachtduur van een hond bedraagt ongeveer **63 dagen**, geteld vanaf de datum waarop ze gedekt is. We zeggen gemiddeld, omdat het kan variëren van 57 tot 67 dagen. Het is belangrijk dat u de dekdatum goed noteert, evenals de verwachte bevallingsdatum (dus 63 dagen na de dekdatum).

Zorg er zeker voor dat uw teef correct gevaccineerd is. Indien dit niet het geval is kan dit nog tijdens de eerste 2-3 weken van de dracht. Daarna raden we het af.

Wij raden u aan uw teef op **dag 10** na de dekdatum te vaccineren tegen **herpes**. Deze vaccinatie voorkomt dat de embryo's geïnfecteerd raken en zullen afsterven.

Gedurende de eerste maand hoeft u verder niets meer te doen. Het kan zijn dat het gedrag van uw teef wat begint te veranderen; ze wordt wat rustiger. Dit is perfect normaal.

Vanaf **dag 25** kan de dracht effectief worden vastgesteld aan de hand van een **echo**. We kunnen dan een schatting maken van het aantal pups. Het bepalen van het exacte aantal is door de ligging en beperkte ruimte in de baarmoeder niet mogelijk, dit gebeurt later aan de hand van een röntgenfoto wanneer de skeletjes zich hebben ontwikkeld.

Na de eerste 4 weken begint de buik van je teef al aardig uit te zetten, haar tepels zijn rozer van kleur en misschien al een klein beetje groter geworden. Dit is allemaal perfect normaal. We raden u aan vanaf nu te starten met **voeding** voor drachtige teven of gewoon simpele puppiebrokken. Op deze manier krijgt ze voldoende energie binnen voor de groei van haar puppies en de aanmaak van de melk. Door de sterke groei van de puppies ontstaat er een druk op o.a. de maag waardoor de teef minder voeding kan opnemen. Verdeel daarom de voeding over meerdere kleinere maaltijden per dag zodat ze toch voldoende voeding en energie binnenkrijgt.

Vanaf **dag 45** kunt u een röntgenfoto laten maken om exact te weten hoeveel puppies uw teef momenteel draagt. Wij raden u dit wel aan zodat u weet wat er u tijdens de bevalling te wachten staat (zitten er bv. 5 in en er komen er maar 4 uit, dan moet u aan de bel trekken).

2 weken voor de verwachte partusdatum raden wij u aan uw teef nogmaals te ontwormen (met producten die hiervoor geschikt zijn).

10 dagen voor de verwachte partusdatum raden wij u aan uw teef nogmaals te vaccineren tegen **herpes**. Deze vaccinatie beschermt de, al volledig volgroeide en gezonde, puppies tegen een infectie vanuit het geboortekanaal en dus tijdens de geboorte.

Hou gedurende de laatste 10 dagen de **temperatuur** van je teef dagelijks (2x per dag) in de gaten zodat je een idee krijgt van haar normale lichaamstemperatuur. (De normale lichaamstemperatuur van een hond is tussen de 38-39°C)

Verder moet u ervoor zorgen dat uw teef een plek heeft waar ze zich kan terugtrekken en waar straks de bevalling kan plaatsvinden. Schaf evt. een werpkist aan. Zorg voor een rustige plek en een voldoende zachte ondergrond.

Naderende bevalling

Aan de hand van het **gedrag** van uw teef kunt u een voorzichtige inschatting maken. We zeggen voorzichtig omdat sommige teven dit gedrag al vertonen enkele dagen voor de bevalling.

Wanneer de bevalling nadert wordt ze onrustig, loopt ze veel heen en weer, begint ze een nest te maken, begint ze te graven en te krabben in haar mand, sleurt ze speeltjes, kussens of dekens in haar mand, wil ze minder eten, vaker plassen en begint ze zwaarder adem te halen. Een heldere, slijmerige uitvloeiing is soms al 1-2 dagen voor de geboorte aanwezig.

De beste manier om een naderende bevalling vast te stellen is aan de hand van de **lichaamstemperatuur**. 24 uur voor de bevalling zal haar temperatuur gemiddeld **1 graad (0,5-1,5°C) dalen**. Als u haar temperatuur al gedurende 10 dagen 2-3x per dag opvolgt zult u een daling van de temperatuur al snel waarnemen. Vanaf dit moment kunt de **bevalling 12-24 uur later** verwachten.

De bevalling

Het kernwoord hier is **RUST**. Tijdens de bevalling is het belangrijk dat het rustig is in huis en dat er geen stress of drukte aanwezig is. Te veel stress kan de bevalling namelijk aanzienlijk vertragen, met alle gevolgen van dien. Probeer dus kalm te blijven en de teef op haar gemak te stellen.

Uw teef begint sneller adem te halen en weldra kunt u een **eerste perspoging** verwachten. De bevalling is nu echt begonnen. De puppies kunnen op 2 verschillende manieren geboren worden; het hoofdje of de voorpootjes eerst (kopligging) of eerst de achterpootjes of het kontje (stuitligging).

Bij de **eerste pup** kan het zo'n **15-45min** duren vooraleer het effectief geboren is. Wanneer de pup naar buiten komt kan het zijn dat het nog in zijn/haar **vruchtzakje** zit. Normaal gesproken bijt de teef deze onmiddellijk stuk en zal ze het van de pup aflikken. Gebeurt dit niet, dan moet u zo snel mogelijk de vliezen verwijderen. Begin bij de kop en maak het neusje vrij en wrijf evt slijm/vocht eruit. Het beste is om de pup daarna zo snel mogelijk terug bij de moeder te leggen zodat zij haar pup kan **schoonlikken**. Dit is goed om de ademhaling te stimuleren, maar ook voor de band tussen moeder en haar pup. Gebeurt dit niet, dan zult u de pup met een handdoek moeten droogwrijven. Op deze manier stimuleert u de ademhaling (en het hartje) van de pup.

De **navelstreng** wordt normaal gesproken door de teef kapotgebeten. Gebeurt dit niet, zult u ook hierbij een handje moeten helpen. Scheur (niet knippen) de navelstreng (evt. na

afklemmen met een klem) vrij ver (ongeveer 1-1,5cm) van de buik af en ontsmet het met **isobetadine**. Indien u niet weet hoe dit te doen belt u best even uw dierenarts.

De tijd die tussen de geboorte van twee opeenvolgende pups ligt noemt men de "**tussenpuptijd**". Deze bedraagt gemiddeld **3 kwartier (45min)**, maar kan behoorlijk variëren. Als de teef niet perst is het niet erg als er na 4-5 kwartier nog steeds geen pup geboren is. Is ze wel aan het persen dan moet er binnen de 3 kwartier toch wel een pup geboren worden.

Zorg ervoor dat u goed controleert dat er na iedere pup een **nageboorte** afkomt (of dat u er in ieder geval op het einde in totaal evenveel geteld heeft als het aantal puppies). Het is perfect normaal als de teef de nageboortes opeet. Voorkom echter dat ze er te veel op eet (1 à 2 is ok), dit kan diarree geven.

Zijn alle pups gezond en wel geboren, en zijn alle nageboorte mee afgekomen dan is het belangrijk om te controleren of de teef **melk** geeft. Dit kun je controleren door zachtjes aan de tepels te trekken. Wanneer er witte of witgelige melk uitkomt is dit goed en kunt u de puppies aan de tepels leggen. Indien dit niet het geval is belt u best even naar uw dierenarts. Deze zal langskomen om een injectie te geven die de melkproductie zal opwekken.

Na de bevalling

Na de geboorte worden alle puppies gewogen. Noteer deze **gewichten** goed. U zult de puppies vanaf nu iedere dag moeten wegen om hun groei bij te kunnen houden. Het gewicht moet iedere dag toenemen. Gebeurt dit niet, dan is dit vaak een teken dat de pup onvoldoende melk binnenkrijgt (om verschillende redenen). De eerste dag na de bevalling kan het soms zijn dat een pup lichter is dan de dag ervoor. Dit is geen probleem zolang de dag erna wel een stijging in het gewicht wordt waargenomen.

Puppies kunnen nog niet zelf hun eigen lichaamstemperatuur regelen. Het is dus belangrijk dat u de puppies goed warm houdt. Dit kunt u het beste doen door een **warmtelamp** boven het nest te hangen (niet te hoog, en niet te laag). Gebruik zeker geen warmtematje, deze kan zorgen voor brandwonden.

De omgevingstemperatuur moet de eerste weken 24-27°C bedragen.

Wat de teef betreft is het belangrijk dat ze naar haar pups omkijkt. Houdt gedurende de eerste 5-7 dagen haar temperatuur nog in de gaten. Ze mag zeker geen koorts maken. Een lichte verhoging (<39,5°C) is normaal.

Na de bevalling zal de teef nog ongeveer **3 weken uitvloeiing** hebben. De kleur zal veranderen van donkergroen naar helder geel.

De teef blijft gedurende de hele lactatieperiode **puppiebrokjes** krijgen. Vanaf een leeftijd van 3 weken kunnen de pups al van de brokjes mee-eten, als ze gewekt zijn in water. Al snel zullen ze ook de droge brokjes kunnen eten. Vanaf 5-6 weken na de bevalling mag u voor de teef langzaam teruggaan naar haar normale voeding.

Wij raden aan de pups vanaf 8-9 weken (na hun eerste vaccinatie) naar een nieuw huisje te laten gaan ivm de socialisering. Puppies leren heel veel van elkaar en van hun moeder. Hoe langer ze bij elkaar en mama kunnen blijven, hoe beter.

Wanneer belt u uw dierenarts?

- Als u een bruingroene uitvloeï ziet bij uw teef
- Als de teef krampen of spiertrillingen heeft (dit wijst vaak op een calciumtekort, koorts, of andere problemen)
- Als de teef langer dan 3 kwartier ligt te persen
- Als de pups niet drinken
- Als er geen gewichtstoename is bij een van de pups
- Als er pups doodgaan na de geboorte
- Als de teef niet omkijkt naar haar pups
- Als de teef een temperatuur heeft hoger dan 39,5°C
- Bij iedere abnormaliteit die u niet vertrouwt

Wat nu verder?

Ontworming: Puppies worden ontwormd op **2, 4, 6 en 8 weken** leeftijd. Ontworm mama best mee gedurende deze periode.

Vervolgens 1x/mnd totdat ze een leeftijd hebben van 6 maanden.

Vanaf dan geldt het volwassen ontwormingsschema (4x/jaar).

Vaccineren: De eerste vaccinatie gebeurt bij de fokker zelf op een leeftijd van **8 weken** (of evt op **6 (en 9) weken**). Wij zijn van mening dat de pups via de moedermelk voldoende antistoffen binnenkrijgen waardoor de eerste vaccinatie op 6 weken niet perse nodig is.

De tweede vaccinatie doet de nieuwe eigenaar op **12 weken**.

De derde vaccinatie gebeurt op een leeftijd van **16 weken**.

Indien de pup verhuist naar het buitenland is het belangrijk te weten dat dit pas wettelijk is toegestaan vanaf 15 weken. Deze pups moeten op 12 weken dan nog gevaccineerd worden tegen **rabiës**.

Chippen: Wettelijk gezien moet dit gebeuren voordat de pups **verhuizen** naar hun nieuwe eigenaar of **vóór** de leeftijd van **4 maanden**.

Sterilisatie: Dit is voor iedere dierenarts anders. Wij houden de regel aan te steriliseren en te castreren nadat ze zijn uitgegroeid. Gemiddeld is dit op een leeftijd van 1-1,5 jaar, en bij teefjes ongeveer na hun eerste of tweede loopsheid.

Heel veel succes!

Indien jullie na het lezen van deze informatie nog vragen hebben mogen jullie ons altijd contacteren!

DAP Equiva

paard & kleine huisdieren